

SANTIAGO TORMO MARTINEZ

Cirugía Ortopédica y Traumatología



CIRUGIA DE LIBERACION NERVIO CUBITAL

LA PATOLOGIA DEL NERVIO CUBITAL SE PRODUCE POR LA COMPRESION DEL MISMO A SU PASO POR UN CANAL A NIVEL DEL CODO (EPICONDILLO MEDIAL)

PUEDA ESTAR FAVORECIDO POR MULTIPLES CAUSAS, DESDE TRAUMATISMOS, GESTOS REPETITIVOS, INFLAMACIÓN DEL CODO, SECUELAS DE FRACTURAS.

SU COMPRESION PRODUCE CLINICA DE HORMIGUEO Y ADORMECIMIENTO DE LA MANO EN LA REGION DEL 5º DEDO Y LA MITAD CUBITAL DEL 4º. ADEMAS PUEDE PRODUCIR DEFICITS MOTORES, ATROFIAS MUSCULARES, DEFICIT DE FUERZA DE AGARRE

LIBERACION DEL NERVIO CUBITAL A NIVEL DE SU PASO POR EL CANAL EPICONDILEO DEL CODO.

LA RECUPERACION TRAS LA CIRUGIA SUELE PRODUCIRSE DE MANERA RAPIDA CON DESPARICION DEL HORMIGUEO Y LA CLINICA SENSITIVA. LA CICATRIZACION Y EL TRABAJO DE LA HERIDA ES CLAVE PARA EVITAR POSIBLES COMPLICACIONES COMO DOLOR DE LA CICATRIZ. ES PREVISIBLE LA INCORPARACION LABORAL EN POCAS SEMANAS DESDE LA CIRUGIA.

INERVACION SENSITIVA



EL DIAGNOSTICO ES CLINICO POR LA EXPLORACION Y SE PUEDE COMPLEMENTAR CON PRUEBAS RADIOLOGICAS Y ELECTROMIOGRAMA.

EL TRATAMIENTO EN FASES INICIALES SE REALIZA DE MANERA CONSERVADORA, REPOSO, ANTIINFLAMATORIOS E INCLUSO CON ADAPTACION DEL TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL PARA EVITAR GESTOS DE SOBRECARGA REPETIDA DE LA EXTREMIDAD. TAMBIEN EN OCASIONES LA FISIOTERAPIA PUEDE SER EFECTIVA.

EN FASES MAS AVANZADAS EL TRATAMIENTO ES QUIRURGICO MEDIANTE